
Problema 224

En la siguiente gráfica se cumple que: $\frac{PQ}{QG} = \frac{3}{1}$, y ABC es rectángulo si "G" su baricentro calcular el ángulo ACB




Propuesto por: William Rodríguez Chamache.

Profesor de Geometria de la "Academia integral class" Trujillo- Perú.

Rodríguez, W. (2005): Comunicación personal.

Solución de F. Damián Aranda Ballesteros, profesor del IES Blas Infante de Córdoba.

Sea el triángulo ABC, de catetos AB=c, BC=a y de hipotenusa AC=b. Por tanto, se tendrá que $a^2+c^2=b^2$. Hallaremos además la relación particular existente entre dichos lados para así poder



caracterizar el ángulo ACB. Sea α =<ACB. En la figura dada tenemos que: α =<ACB=<RPA Y además 2α =<ROG. También sabemos que:

$$sen \alpha = \frac{c}{b}; \cos \alpha = \frac{a}{b}$$

La longitud OB de la mediana relativa a la hipotenusa es igual al radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, es decir, igual a la mitad de la hipotenusa, b/2. Así tenemos que OG=b/6.

En el triángulo rectángulo OGR, tenemos las siguientes relaciones de interés:

$$sen 2\alpha = \frac{GR}{b/6}; \quad sen 2\alpha = 2sen \alpha.cos \alpha = \frac{2ac}{b^2};$$
Así, $GR = \frac{ac}{3b}$

Por otro lado:

$$\cos 2\alpha = \frac{OR}{\frac{b}{6}}$$
; $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{a^2 - c^2}{6b}$; Así, $OR = \frac{a^2 - c^2}{6b}$

Con estos datos de interés, podemos determinar el valor del segmento GQ. Para ello, veamos que: GQ = RQ - GR.

$$\tan \alpha = \frac{RQ}{RC} = \frac{RQ}{CO + OR} = \frac{RQ}{\frac{b}{2} + \frac{a^2 - c^2}{6b}} = \frac{RQ}{\frac{a^2 - c^2 + 3b^2}{6b}};$$

En el triángulo CRQ, tenemos que:

$$\tan \alpha = \frac{c}{a}$$

Luego entonces $RQ = \frac{c}{a} \cdot \frac{a^2 - c^2 + 3b^2}{6b} = \frac{c}{a} \cdot \frac{4a^2 + 2c^2}{6b}$.

Por fin, GQ = RQ - GR;

$$GQ = \frac{c}{a} \cdot \frac{a^2 - c^2 + 3b^2}{6b} = \frac{c}{a} \cdot \frac{4a^2 + 2c^2}{6b} - \frac{ac}{3b} = \frac{c(4a^2 + 2c^2) - 2a^2c}{6ab};$$

$$GQ = \frac{c(2a^2 + 2c^2)}{6ab} = \frac{2cb^2}{6ab} = \frac{cb}{3a}$$

De la condición inicial, $\frac{PQ}{QG} = \frac{3}{1}$, determinamos que $PQ = \frac{cb}{a}$

En el mismo triángulo CRQ, tenemos que: $\cos \alpha = \frac{RC}{QC} = \frac{RO + OC}{QC} = \frac{\frac{a^2 - c^2}{6b} + \frac{b}{2}}{QC}$;

$$\cos \alpha = \frac{a}{b}$$

$$QC = \frac{b}{a} \cdot \left(\frac{a^2 - c^2}{6b} + \frac{b}{2}\right) = \frac{a^2 - c^2 + 3b^2}{6a} = \frac{a^2 + b^2}{3a}$$

Por tanto, BQ = BC - QC será igual a:

$$BQ = a - \frac{a^2 + b^2}{3a} = \frac{2a^2 - b^2}{3a}$$

En el triángulo rectángulo PBQ, semejante al inicial ABC, y por tanto podemos establecer la siguiente relación de igualdad:

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{BQ}{PQ} = \frac{\frac{2a^2 - b^2}{3a}}{\frac{bc}{a}} = \frac{c}{b}; \quad \frac{2a^2 - b^2}{3} = c^2 \Rightarrow a^2 = 4c^2 \Rightarrow a = 2c$$

Así encontramos la relación entre los catetos a y c.

De esta manera, el ángulo α =<ACB queda determinado por la relación $\tan \alpha = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.