Propuesto por Francisco Alcubilla, profesor de Estrategia territorial. Madrid.

Problema 350.

Hallar un punto P interior a un triángulo ABC tal que m.PA+n.PB+p.PC sea mínimo con los datos dados de m, n y p que están relacionados por m+n+p=1.

Alcubilla, F. (2006); Comunicación personal.

Solución de José María Pedret, Ingeniero Naval. Esplugues de Llobregat (Barcelona). (9 de diciembre de 2007)

### **CONSIDERACIONES PREVIAS**

Para el problema del enunciado existen variadas soluciones: algebraicas, geométricas, mecánicas...(ver referencias); en este documento adoptamos las ideas de W. J. Van de Lindt que entendemos que conducen a una resolución bastante simple.

Suponemos ahora que tenemos tres escalares tales que m' + n' + p' = k (k > 0); siempre podemos escribir  $m = \frac{m'}{l_r}$ ,  $n = \frac{n'}{l_r}$ ,  $p = \frac{p'}{l_r}$  por lo que la función  $\mathscr{F}'(P)$ 

$$\mathscr{F}'(P) = m' \cdot PA + n' \cdot PB + p' \cdot PC = k \cdot m \cdot PA + k \cdot n \cdot PB + k \cdot p \cdot PC = k \cdot \mathscr{F}(P)$$

tiene los mismos extremos que  $\mathscr{F}(P)$  y por lo tanto, la condición m+n+p=1 no es necesaria.

Adoptaremos la siguiente notación


$$A = A_1$$
,  $B = A_2$ ,  $C = A_3$ ,  $\overrightarrow{PA_1} = \overrightarrow{d_1}$ ,  $\overrightarrow{PA_2} = \overrightarrow{d_2}$ ,  $\overrightarrow{PA_3} = \overrightarrow{d_3}$ ,  $m = n_1$ ,  $n = n_2$ ,  $p = n_3$ 

La función que se pide minimizar es

$$\mathscr{F}(P) = m \cdot PA + n \cdot PB + p \cdot PC = \sum_{i=1}^{3} n_i \cdot PA_i = \sum_{i=1}^{3} n_i \cdot d_i.$$

Como la función  $\mathscr{F}$  depende de  $d_i$   $(1 \le i \le 3)$ , tomamos una referencia con una base de vectores unitarios dependientes de P,  $\vec{u}_i = \frac{\vec{d}_i}{d_i}$   $(1 \le i \le 3)$ , por lo que también podemos considerar los vectores  $\vec{n}_i = n_i \vec{u}_i$  y el vector  $\vec{\delta} = \frac{\delta}{\sqrt{3}} \left( \vec{u}_1 \ \vec{u}_2 \ \vec{u}_3 \right)$ .

#### DIBUJAMOS EL ENUNCIADO




Suponemos que tenemos el problema resuelto y que el punto P es la solución. Para otro punto P' tal que  $\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{\delta}$  y si  $\mathscr{F}$  tiene un mínimo en P su derivada direccional se anulará y por lo tanto se anulará también su gradiente.

$$\frac{d\mathscr{F}}{d\vec{\delta}} = 0 = \overrightarrow{\text{grad}} \mathscr{F} \cdot \vec{\delta} \quad \forall \vec{\delta}$$

pero


$$\operatorname{grad} \mathscr{F} = \left(\frac{\partial \mathscr{F}}{\partial d_1} \frac{\partial \mathscr{F}}{\partial d_2} \frac{\partial \mathscr{F}}{\partial d_3}\right) = \left(n_1 \ n_2 \ n_3\right) = n_1 \overrightarrow{u_1} + n_2 \overrightarrow{u_2} + n_3 \overrightarrow{u_3} = \overrightarrow{n_1} + \overrightarrow{n_2} + \overrightarrow{n_3} = 0$$

Es decir, los vectores  $\overrightarrow{n_1}$ ,  $\overrightarrow{n_2}$ ,  $\overrightarrow{n_3}$  deben formar un triángulo.



Observando la figura vemos que  $\alpha_2 + \nu_2 = \pi$ , de ello deducimos que P debe estar en el arco opuesto al arco capaz de ángulo  $\nu_2$  inscrito en el segmento  $A_3A_1$ ; análogamente P debe estar en el arco opuesto al arco capaz de ángulo  $\nu_3$  inscrito en el segmento  $A_1A_2$ . De estas dos últimas condiciones se desprende que P debe estar en el arco opuesto al arco capaz de ángulo  $\nu_1$  inscrito en el segmento  $A_2A_3$ .


# **SOLUCIÓN**



- Con centro en  $A_1$  rotamos la recta  $A_3A_1$  el ángulo  $v_2=\angle(n_3,n_1)$  y por  $A_1$  perpendicular a esta última recta que corta a la mediatriz de  $A_3A_1$  en  $O_2$ .
- Con centro en  $O_2$  circunferencia que pasa por  $A_3$  (y  $A_1$ ).
- Con centro en  $A_1$  rotamos la recta  $A_1A_2$  el ángulo  $v_3=\angle(n_1\,,n_2)\,$  y por  $A_1$  perpendicular a esta última recta que corta a la mediatriz de  $A_1A_2\,$  en  $O_3\,$ .
- Con centro en  $O_3$  circunferencia que pasa por  $A_1$  (y  $A_2$ ).
- La intersección de las dos circunferencias da el punto P que minimiza la expresión del enunciado.

# DISCUSIÓN

Para que exista el mínimo, el punto P debe ser interior al triángulo ABC.



Basta suponer que P es exterior. Trazamos desde P una perpendicular a un lado del triángulo y obtenemos P' sobre ese lado, basta observar la figura para ver que en estas condiciones

$$d_1' < d_1 \quad d_2' < d_2 \quad d_3' < d_3$$

y por lo tanto

$$\mathscr{F}(P) = \sum_{i=1}^{3} n_i \cdot d_i > \sum_{i=1}^{3} n_i \cdot d_i' = \mathscr{F}(P')$$

El hecho de que el punto deba ser interior al triángulo se traduce como (ver figura 3)

$$\angle A_2 P A_3 > \angle A_2 A_1 A_3 \implies \cos(\angle A_2 P A_3) < \cos(A_2 A_1 A_3)$$

y como

$$n_1^2 = n_2^2 + n_3^2 + 2n_2n_3\cos(n_2, n_3) = n_2^2 + n_3^2 + 2n_2n_3\cos(\pi - \angle A_2PA_3) =$$

$$= n_2^2 + n_3^2 - 2n_2n_3\cos(\angle A_2PA_3)$$

y escribiendo  $a_1=A_2A_3,\,a_2=A_3A_1,\,a_3=A_1A_2$  podemos poner la desigualdad de cosenos para cada ángulo como

$$-\frac{n_1^2 - n_2^2 - n_3^2}{2n_2n_3} < \frac{a_1^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3}, \quad -\frac{n_2^2 - n_3^2 - n_1^2}{2n_3n_1} < \frac{a_2^2 - a_3^2 - a_1^2}{2a_3a_1}, \quad -\frac{n_3^2 - n_1^2 - n_2^2}{2n_1n_2} < \frac{a_3^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}$$

Por otra parte si los  $n_i$  no son los lados de un triángulo, podemos suponer que  $n_1 \ge n_2 + n_3$  y en estas condiciones

$$n_{1} \cdot d_{1} + n_{2} \cdot d_{2} + n_{3} \cdot d_{3} \ge (n_{2} + n_{3}) \cdot d_{1} + n_{2} \cdot d_{2} + n_{3} \cdot d_{3} =$$

$$= n_{2}(d_{1} + d_{2}) + n_{3}(d_{3} + d_{1}) =$$

$$= n_{2}(PA_{1} + PA_{2}) + n_{3}(PA_{3} + PA_{1}) \ge$$

$$\ge n_{2}(A_{1}A_{2}) + n_{3}(A_{3}A_{1})$$

lo que nos indica que el mínimo está en  $A_1$ . Análogamente obtendríamos los otros vértices. Para discernir el vértice en el caso de  $n_1 = n_2 > n_3$  el mínimo estaría en el vértice que tenga un mayor ángulo.

### **RESULTADOS**

Si  $n_1 = n_2 = n_3 = 1$ , estamos en el caso del problema de Fermat, el triángulo de los  $n_i$  es equilátero y los ángulos  $\angle A_i P A_i = 120^\circ$ .

Quien quiera trabajar un poco más puede comprobar que

- Si los  $n_i$  coinciden con los  $a_i$  y los ángulos del triángulo dado son agudos,  $\mathscr{F}(P) = 4S$ , donde S es el área del triángulo dado. El punto P es el ortocentro del triángulo dado.
- Si  $n_1 = I_2I_3$ ,  $n_2 = I_3I_1$ ,  $n_3 = I_1I_2$ , donde los  $I_i$  son los ex-incentros del triángulo dado, entonces  $\mathscr{F}(P) = 4Rs$ , donde s y R son respectivamente el semiperímetro y el radio del círculo circunscrito al triángulo dado. El punto P es el incentro del triángulo dado.
- Si  $n_i = \text{sen}(2\beta_i)$ , donde los  $\beta_i$  son los ángulos del triángulo dado. El punto P es el circuncentro del triángulo dado y entonces  $\mathscr{F}(P) = 4R \text{ sen } \beta_1 \text{ sen } \beta_2 \text{ sen } \beta_3$ .
- Si  $\frac{n_1}{m_1} = \frac{n_2}{m_2} = \frac{n_3}{m_3}$ , donde  $\log m_i$  son las medianas del triángulo dado entonces el punto P es el baricentro. Si  $\frac{n_i}{m_i} = 1$ , entonces  $\mathscr{F}(P) = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)$ .

## **REFERENCIAS**

- 1. I. Greenberg and R.A. Robertello. The three factory problem, MATHEMATICS MAGAZINE 38 (1965). 67-72
- 2. W. J. Van de Lindt. Ageometrical solution of the three factory problem., MATHEMATICS MAGAZINE 39 (1966).162-165
- 3. Jingcheng Tong and Yap S. ChuaThe generalized Fermat's point, MATHEMATICS MAGAZINE 68 (1995).214-215
- 4. Shay Gueron and Ran Tessler, The Fermat-Steiner problem, THE AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 109, No. 5 (May, 2002), pp. 443-451.