Problema 373 de triánguloscabri. Demostrar que el perímetro de un triángulo acutángulo y el de su triángulo órtico son proporcionales a los radios de los círculos circunscrito e inscrito en el primero.

Matemática Elemental (1933) Tomo II, N.2, Febrero, págs. 26-29.

Propuesto por Juan Bosco Romero Márquez.

Solución de Francisco Javier García Capitán.

Sea DEF el triángulo órtico del triángulo ABC. Por ser el triángulo ABC acutángulo es $AE = c \cos A$ y $AF = b \cos A$, los triángulos ABC y AEF son semejantes y $EF = a \cos A$.

De la misma forma es $DE = c \cos C$ y $FD = b \cos B$.

Entonces el perímetro de DEF es

$$p' = a\cos A + b\cos B + c\cos C =$$

$$= a \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + b \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac} + c \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ac} =$$

$$= \frac{a^2(b^2 + c^2 - a^2) + b^2(c^2 + a^2 - b^2) + c^2(a^2 + b^2 - c^2)}{2abc} =$$

$$= \frac{(a + b + c)(b + c - a)(c + a - b)(a + b - c)}{2abc} =$$

$$= \frac{4p(s - a)(s - b)(s - c)}{abc}.$$

Ahora, teniendo en cuenta las fórmulas del área

$$S = sr = \frac{abc}{4R} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

obtenemos

$$\frac{r}{R} = \frac{\frac{S}{s}}{\frac{abc}{4S}} = \frac{4S^2}{sabc} = \frac{4s(s-a)(s-b)(s-c)}{sabc} = \frac{4(s-a)(s-b)(s-c)}{abc}.$$

Queda entonces claro que p'/p = r/R, como había que demostrar.