Ejercicio 52 Triángulos (2224-405)


Sean \widehat{ABC} un triángulo no rectángulo en A y V un punto situado sobre la recta BC, distinto de los vértices. La paralelas a AC y AB por por V cortan a AB y AC en D y E, respectivamente. La perpendicular a AB por V corta en G a AC. La perpendicular a AC por V corta en F a AB. Además consideramos los puntos de intersección $J = GD \cap VF$ y $K = EF \cap VG$.

a) Demostrar que cada uno de los siguientes enunciados es cierto si y sólo si AV es una de las bisectrices del ángulo A.

DE es paralela a FG. FG es paralela a JK. DG, EF y AV son concurrentes. El triángulo \widehat{VFG} es isósceles.

b) V es el ortocentro de \widehat{AFG} .

SOLUCIÓN:



Propuesta quincenal de problemas de triángulos para resolverlos con Cabri de Laboratorio virtual de triángulos con Cabri II (Problema 398. Julio 2007): http://www.personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/index.htm

Lo resolveremos utilizando coordenadas baricéntrias⁽¹⁾ relativas al triángulo dado \widehat{ABC} , respecto a las cuales, los vértices son:

las ecuaciones de los lados y de la recta del infinito son⁽²⁾:

$$BC: x = 0, \quad CA: y = 0, \quad AB: z = 0, \qquad \ell_{\infty}: x + y + z = 0.$$

El incentro I y los exincentros⁽³⁾ I_a , I_b e I_c :

$$I(a, b, c),$$
 $I_a(-a, b, c),$ $I_b(a, -b, c),$ $I_c(a, b, -c),$

donde $a, b \ y \ c$ son las longitudes de los lados opuestos a los vértices $A, B \ y \ C$, respectivamente. Las ecuaciones de las bisectrices, interna y externa, por el vértice A son:

$$AI: cy - bz = 0,$$
 $AI_b: cy + bz = 0,$

y los puntos de intersección de éstas con el lado BC:

$$V_a(0, b, c), W_a(0, -b, c).$$

Angel Montesdeoca

 $^{^{(1)}}$ Una buena referencia para el uso de coordenadas baricéntrias, en problemas relativos a triángulos, es: Paul Yiu.- Introduction to Geometry of the Triangle. http://www.math.fau.edu/yiu/GeometryNotes020402.ps

Nos referimos a esta obra, por ejemplo, con la cita: Paul Yiu, pág ### (para un hecho contenido en tal página).

 $^{{}^{(2)}\}mathrm{Paul}$ Yiu, pág. 46

⁽³⁾ Paul Yiu, pág. 26

Si una recta ℓ tiene punto del infinito (f, g, h), las coordenadas del punto del infinito de una recta perpendicular a ℓ son⁽⁴⁾:

$$(gS_B - hS_C, hS_C - fS_A, fS_A - gS_B),$$

donde

$$S_A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$$
, $S_B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2}$, $S_C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$, (notación de Conway)

con lo que $S_B + S_C = a^2$, $S_C + S_A = b^2$ y $S_A + S_B = c^2$.

Sea V(0,1,t) un punto en el lado BC, distinto de B y C. La recta paralela por V al lado AB pasa por el punto del infinito (1,-1,0) de éste, por lo que su ecuación es tx+ty-z=0, y E(1,0,t) es el punto de intersección de dicha paralela con el lado AC. Así mismo, el punto de intersección de la paralela a AC por V es D(t,1,0).

Las perpendiculares a AB (con punto del infinito (1, -1, 0)) y a AC (con punto del infinito (1, 0, -1)) por V tienen por ecuaciones, respectivamente,

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 0 & 1 & t \\ -S_B & -S_A & S_A + S_B \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} x & y & z \\ 0 & 1 & t \\ S_C & -S_C - S_A & S_A \end{vmatrix} = 0.$$

El punto de intersección G de la primera con el lado AC y F de la segunda con el lado AB son

$$F(-tS_C, S_A + S_A t + S_C t, 0), \qquad G(-S_B, 0, S_A + S_B + tS_A).$$

 \bullet a1) Para que las rectas DE y FG sean paralelas, sus puntos del infinito han de coincidir:

$$\lambda(1-t, -1, t) = (S_B - S_C t, S_A + S_A t + S_C t, -S_A - S_B - S_A t).$$

Esto ocurre cuando

$$t = \pm \frac{\sqrt{S_A + S_B}}{\sqrt{S_A + S_C}} = \pm \frac{c}{b}, \qquad \lambda = \frac{a^2 - (b \pm c)^2}{2},$$

o sea, cuando V(0,1,t) coincide con $V_a(0,b,c)$ o $W_a(0,-b,c)$, es decir, cuando AV es una de las bisectrices en A. Con lo que queda probada la primera equivalencia del apartado a).

ullet a2) La intersección de las rectas DG y VF da el punto J:

$$DG: (S_A + S_B + S_A t)x - (S_A + S_B + S_A t)ty + S_B z = 0, \quad VF: (S_A t + S_A t^2 + S_C t^2)x + S_C t^2 y - S_C t z = 0,$$
$$J\Big(S_A S_C t, S_B S_C + S_A (S_B + S_C), (S_A + S_C)(S_A + S_B + S_A t)t\Big).$$

La intersección de las rectas EF y VG nos da el punto K:

$$EF: (S_At + S_At^2 + S_Ct^2)x + S_Ct^2y - (S_A + S_At + S_Ct)z = 0, \quad VG: (S_A + S_B + S_At)x - S_Bty + SBz = 0,$$

$$K\Big(S_AS_Bt, (S_A + S_B)(S_A + S_At + S_Ct), (S_AS_B + S_AS_C + S_BS_C)t^2\Big).$$

Para que las rectas FG y JK sean paralelas es necesario y suficiente que tengan el mismo punto el infinito.

Como las coordenadas del punto del infinito de la recta JK se obtiene multiplicando la suma de las coordenadas de K por las coordenadas de J y restándole las coordenadas de K multiplicadas por la suma de las coordenadas de J, debemos resolver las ecuaciones:

$$-(S_At(1+t)(S_A^2(-S_C+S_Bt)+S_BS_C(S_B-S_Ct)+S_A(S_B^2-S_C^2t)))=\lambda(S_B-S_Ct)$$

$$-(S_At(1+t)(S_BS_C^2t+S_A^3(1+t)+S_AS_C(S_Ct+2S_B(1+t))+S_A^2(2S_C(1+t)+S_B(2+t))))=\lambda(S_A+S_At+S_Ct)$$

$$S_At(1+t)(S_B^2S_C+S_A^3(1+t)+S_A^2(S_C+2S_Ct+2S_B(1+t))+S_AS_B(S_B+2S_C(1+t)))=\lambda(-S_A-S_B-S_At).$$

Con lo que de nuevo se obtiene que FG y JK son paralelalas si y sólo si $t = \pm c/b$, es decir, si y sólo si AV es una de las bisectrices en A.

Queda así establecida el segundo enunciado del apartado a).

• a3) Para establecer el tercer acerto del apartado a), consideramos las ecuaciones de las rectas:

$$AV: ty - z = 0,$$
 $DG: (S_A + S_B + S_A t)x - (S_A + S_B + S_A t)ty + S_B z = 0,$

⁽⁴⁾ Paul Yiu, pág. 55

$$EF: -(S_A + S_A t + S_C t)tx - S_C t^2 y + (S_A + S_A t + S_C t)z = 0.$$

Para que sean concurrentes ha de ser cero el determinante formado por los coeficientes de las tres:

$$\begin{vmatrix} 0 & t & -1 \\ (S_A + S_B + S_A t) & -(S_A + S_B + S_A t)t & S_B \\ -(S_A + S_A t + S_C t)t & -S_C t^2 & (S_A + S_A t + S_C t) \end{vmatrix} = 0, t = \pm \frac{\sqrt{S_A + S_B}}{\sqrt{S_A + S_C}} = \pm \frac{c}{b}.$$

De nuevo V ha de coincidir con V_a o con W_a .

ullet a4) Probemos ahora que el triángulo \widehat{VFG} es isósceles sólo cuando AV es una de las bisectrices en A (último estamento del apartado a).

En primer lugar, demostremos que AV siempre es perpendicular a FG, cuando V varía en el lado BC de \widehat{ABC} . Para ello, recordemos la siguiente caraterización⁽⁵⁾ de rectas perpendiculares, en coordenadas baricéntricas:

"Dos rectas con puntos del infinito (f,g,h) y (f',g',h') son perpendiculares si y sólo si

$$S_A f f' + S_B q q' + S_C h h' = 0$$
."

En nuestro caso, el punto del infinito de la recta FG es $(S_B - S_C t, S_A + S_A t + S_C t, -S_A - S_B - S_A t)$ y el de la recta AV es (1 + t, -1, -t), luego, AV y FG son perpendiculares, pues:

$$S_A(1+t)(S_B - S_C t) + S_B(-1)(S_A + S_A t + S_C t) + S_B(-t)(-S_A - S_B - S_A t) = 0.$$

Como consecuencia, AV y GV son dos alturas del triángulo \widehat{AFG} ; es decir, V es su ortocentro. Queda así establecido el apartado b).

Para que \widehat{VFG} sea isósceles, la perpendicular por V a su base FG, que es AV, ha de pasar por el punto medio M de FG. El punto medio de FG es $M(-S_B-S_Ct,\ S_A+S_At+S_Ct,S_A+S_B+S_At)$, e imponiendo que esté en la recta $AV:\ ty-z=0$ se tiene que

$$t = \pm \frac{c}{b}$$
.

Con lo que el problema queda resuelto. Si el ángulo en A es recto o V coincide con uno de los vértices B o C, las paralelas y las perpendiculares a los catetos por V coinciden dos a dos, y no tiene sentido el planteamiento del mismo.

Observaciones adicionales.-

— Para demostrar la afirmación cuarta del apartado a):

"El triángulo \widehat{VFG} es isósceles si y sólo si AV es una de las bisectrices del ángulo A", debemos demostrar que el punto medio

$$M(-S_B - S_C t, S_A + S_A t + S_C t, S_A + S_B + S_A t)$$

de FB ha de coincidir con el punto de intersección P de las rectas AV y FG.

Cuando V varía sobre el lado BC el punto M describe una recta y P una cúbica de ecuaciones paramétricas respectivas:


$$\begin{aligned}
 x &= -S_B - S_C t & x &= -(S_B S_C + S_A (S_B + S_C))t(1+t) \\
 y &= S_A + S_A t + S_C t & y &= (S_A + S_B + S_A t)(S_A + S_A t + S_C t) \\
 z &= S_A + S_B + S_A t & z &= t(S_A + S_B + S_A t)(S_A + S_A t + S_C t)
 \end{aligned}$$

Para determinar los puntos comunes a estas curvas, debemos encontrar los valores de t para que sus coordenadas coincidan, $\{P\} = \lambda\{M\}$, obteniéndose que

$$t = \pm \frac{c}{b}, \qquad \lambda = \pm \frac{c(-a^2 \pm (b+c)^2)}{2b}.$$

lo que equivale a que el punto AV sea una de las bisectrices en A. Las rectas que unen el vértice A con los de intersección de recta y cúbica (obtenidas como lugares geométricos) cortan al lado BC en los puntos que satifacen la condición impuesta.

⁽⁵⁾Paul Yiu. pág. 55



El tercer punto de intersección de la recta (lugar geométrico de M) con la cúbica (lugar geométrico de P) no corresponde a un mismo valor de t.

— Para plantear el problema cíclicamente a todos los vértices del triángulo \widehat{ABC} , cambiamos la notación de la forma siguiente:


Sean \overrightarrow{ABC} un triángulo acutángulo y V un punto situado sobre la recta BC, distinto de los vértices. La perpendicular a AB por V corta en A_b a AC. La perpendicular a AC por V corta en A_c a AB. Entonces el lugar geométrico del punto medio M_a de A_bA_c , cuando V varía en el lado BC, es una recta ℓ_a .

Si ahora el punto V es un punto de la recta AC, la perpendicular a AB por V corta a BC en B_a y la perpendicular a BC por V corta a AB en B_c . Entonces el lugar geométrico del punto medio M_b de B_aB_c , cuando V varía en el lado AC, es una recta ℓ_b .

Finalmente, si el punto V es un punto de la recta AB, la perpendicular a BC por V corta a AC en C_b y la perpendicular a AC por V corta a BC en C_a . Entonces el lugar geométrico del punto medio M_c de C_aC_b , cuando V varía en el lado AB, es una recta ℓ_c .

Las ecuaciones paramétricas de estas rectas, descritas por M_a, M_b y M_c , son:

$$\ell_a: \left\{ \begin{array}{l} x = -S_B - S_C t \\ y = S_A + S_A t + S_C t \\ z = S_A + S_B + S_A t \end{array} \right. \qquad \ell_b: \left\{ \begin{array}{l} x = S_B + S_B t + S_C t \\ y = -S_A - S_C t \\ z = S_A + S_B + S_B t \end{array} \right. \qquad \ell_c: \left\{ \begin{array}{l} x = -S_C - S_B t - S_C t \\ y = -S_A - S_C - S_C t \\ z = S_A + S_B t \end{array} \right.$$



Ocurre entonces que las tres rectas ℓ_a, ℓ_b y ℓ_c determinan un triángulo $\widehat{A'B'C'}$ perspectivo con \widehat{ABC} con centro de perspectividad en el punto de coordenadas baricéntricas

$$\left(S_{A}^{4}S_{B}^{4}+S_{A}^{4}S_{C}^{4}-S_{B}^{4}S_{C}^{4}-2S_{A}^{4}S_{B}^{2}S_{C}^{2},\quad S_{B}^{4}S_{C}^{4}+S_{B}^{4}S_{A}^{4}-S_{C}^{4}S_{A}^{4}-2S_{B}^{4}S_{C}^{2}S_{A}^{2},\quad S_{C}^{4}S_{A}^{4}+S_{C}^{4}S_{B}^{4}-S_{A}^{4}S_{B}^{4}-2S_{C}^{4}S_{C}^{2}S_{B}^{2}\right).$$

Se trata de un punto denominado "triangle center" en "The Encyclopedia of Triangle Centers (ETC)" de Clark Kimberling⁽⁶⁾, ya que la primera componente de sus coordenadas

$$f(a,b,c) = S_A^4 S_B^4 + S_A^4 S_C^4 - S_B^4 S_C^4 - 2S_A^2 S_B^2 S_C^4,$$

es una función homogénea de las longitudes de los lados de \widehat{ABC} y verifica que tal punto se expresa por

Y además, se verifica que f(a, b, c) = f(a, c, b).

Si evaluamos las coordenadas del centro de perspectividad de los triángulos \widehat{ABC} y $\widehat{A'B'C'}$ en un triángulo de lados $a=6cm,\,b=9cm$ y $c=12cm,\,$ la distancia de dicho punto al lado menor BC es⁽⁷⁾

9.8010047378cm.

http://www.gt.matfun.ull.es/angel/pdf/ejtr2224.pdf

⁽⁶⁾ http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/index.html

⁽⁷⁾ No figura en la Enciclopedia ETC, pero es el conjugado isogonal del X(1498)