

Cuadrado baricéntrico y raiz baricéntrica

ANGEL MONTESDEOCA

Dado un punto P(u:v:w) en coordenadas baricéntricas, se dan construcciones geométricas de los puntos $P^2(u^2:v^2:w^2)$ y $\sqrt{P}(\sqrt{u}:\sqrt{v}:\sqrt{w})$ y sus justificaciones analíticas.



* Coordenadas baricéntricas y trilineales

Las coordenadas baricéntricas fueron introducidas por A.F. Möbius in 1827, como una respuesta a la cuestión sobre qué masas se deben colocar en los vértices de un triángulo para que un punto dado sea el centro de gravedad de estas masas.

Con respecto a un triángulo fijo \widehat{ABC} , a todo punto P de su plano se le puede asignar una terna (u:v:w) de tal forma que si u es la masa en A, v en B y w en C, el centro de gravedad está en P. Estas masas pueden ser tomadas proporcionales 1 a las áreas de los triángulos \widehat{PBC} , \widehat{PCA} y \widehat{PAB} .

Las coordenadas baricéntricas homogéneas de P con respecto al triángulo \widehat{ABC} es la terna (u:v:w) tal que

$$(u:v:w) \equiv (\Delta \widehat{PBC}: \Delta \widehat{PCA}: \Delta \widehat{PAB})$$

Se entiende que el área de un triángulo \widehat{XYZ} es cero si X,Y,Z están alineados, positiva si la orientación de los vértices es en el sentido contrario a las agujas de un reloj y negativa en otro caso. Por ejemplo, todo punto P sobre el lado BC, tiene por coordenadas baricéntricas homogéneas

$$(0:PC:BP) \equiv (0:\Delta \widehat{PCA}:\Delta \widehat{PAB}).$$

$$P(1-x-y,x,y)$$


Las coordenadas de P respecto a un sistema de coordenadas ortonormales $\{A; \vec{e_1}, \vec{e_2}\}$ con vector unitario $\vec{e_1}$ en la dirección de \overrightarrow{AB} , son $P(cx+by\cos A,by\sin A)$. Se tiene también que $A(0,0),\ B(c,0)$ y $C(b\cos A,b\sin A)$. Resultan las siguientes áreas de triángulos:

$$2\Delta \widehat{PBC} = \begin{vmatrix} cx + by \cos A & by \sin A & 1 \\ c & 0 & 1 \\ b \cos A & b \sin A & 1 \end{vmatrix} = (1 - x - y)bc \sin A, \quad 2\Delta \widehat{PCA} = \begin{vmatrix} cx + by \cos A & by \sin A & 1 \\ b \cos A & b \sin A & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = xbc \sin A,$$

$$2\Delta \widehat{PAB} = \begin{vmatrix} cx + by \cos A & by \sin A & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ c & 0 & 1 \end{vmatrix} = ybc \sin A.$$

 $^{^1}$ Si P(x,y) son las coordenadas respecto a la referencia afín $\{A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}\}, \ \overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC},$ sus coordenadas baricéntricas son

Dado un triángulo de referencia \widehat{ABC} las coordenadas trilineales homogéneas en un punto P con respecto A \widehat{ABC} es la terna $(\alpha : \beta : \gamma)$ que son proporcionales a las distancias de P a los lados.



Para establecer la relación que existe entre las coordenadas baricéntricas (u:v:w) y trilineales $(\alpha:\beta:\gamma)$, basta observar que

$$(u:v:w) \equiv (aa':bb':cc')$$
 y $(\alpha:\beta:\gamma) \equiv (a':b':c')$.

Así, las coordenadas baricéntricas de un punto de coordenadas trilinelaes $(\alpha:\beta:\gamma)$ son $(a\alpha:b\beta:c\gamma)$. Y un punto de coordenadas baricéntricas (u:v:w) tiene por coordenadas trilineales $(\frac{u}{a},\frac{v}{b},\frac{w}{c})$.

Ejemplo.- El incentro equidista de los lados, luego sus coordenads trilineales son (1:1:1) y por consiguiente sus baricéntricas son (a:b:c).

El baricentro (centro de gravedad del triángulo) tiene de coordenadas baricéntricas (1:1:1) y por tando sus coordenadas trilineales son $(\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c})\equiv (bc:ca:ab)$.

* Cuadrado baricéntrico

Sea \widehat{ABC} un triángulo y P un punto en su plano, a las rectas, AP,BP y CP se les denomina cevinas y si denotamos por A',B' y C', los puntos de intersección de ellas con los lados del triángulo, se tienen las siguientes expresiones en coordenadas baricéntricas²:

$$A(1:0:0), \quad B(0:1:0), \quad C(0:0:1), \quad P(u:v:w), \quad A'(0:v:w), \quad B'(u:0:w), \quad C'(u:v:0).$$

$$AB: z = 0, \quad AC: y = 0, \quad BC: x = 0, \quad AP: wy - vz = 0, \quad BP: wx - uz = 0, \quad CP: vx - uy = 0.$$

Recordemos que si P(u:v:w) y Q(u':v':w') son dados en coordenadas baricéntricas respecto a un triángulo \widehat{ABC} , satisfaciendo u+v+w=u'+v'+w', el punto X que divide a PQ en la razón

$$\frac{PX}{XQ} = \frac{p}{q}$$


 $^{^2}$ Recíprocamente, si A(0:v:w), B(u:0:w), C(u:v:0), entonces $AA^\prime, BB^\prime, CC^\prime$ son las cevianas del punto P(u:v:w).

tiene por coordenadas baricéntricas


$$X(qu + pu' : qv + pv' : qw + pw').$$

Se dice que X e Y dividen armónicamente a V y W si

$$(X \ Y \ V \ W) = -1$$
 ó $\frac{VX}{XW} = -\frac{VY}{YW}.$



Sea P(u:v:w) un punto dado en coordenadas baricéntricas respecto a un triángulo \widehat{ABC} y A', B' y C' los pies de las cevianas, entonces los centros de homotecia (distintos de A', B' y C') de los pares de circunferencias de diámetros A'B y A'C, B'A y B'C, C'A y C'B, están en una recta y el tripolo de ésta es el punto $P^2(u^2:v^2:w^2)$, denominado cuadrado baricéntrico de P.



Applet CabriJava: http://www.gt.matfun.ull.es/angel/cabri/baric2b.htm

Demostración.- Como los centros de dos circunferencias están armónicamente separados de los centros de homotecia interno y externo³, utilizamos este hecho para determinar las coordenadas baricéntricas de los otros centros de homotecia A'', B'' y C'', distintos de A', B' y C'.

Primero determinemos los puntos medios A_1 y A_2 de los segmentos A'B y A'C:

$$\frac{A'A_1}{A_1B} = \frac{1}{1}, \quad A'(0:v;w), \quad B(0:v+w:0) \implies A_1(0:2v+w:w)$$

$$\frac{A'A_2}{A_2C} = \frac{1}{1}, \quad A'(0:v;w), \quad C(0:0:v+w) \implies A_2(0:v:v+2w)$$

 A^\prime y $A^{\prime\prime}$ dividen armónicamente a A_1 y A_2 si

$$\frac{A_1 A'}{A' A_2} = -\frac{A_1 A''}{A'' A_2} = \frac{p}{q},$$

así,

$$A'(0:v:w) \equiv (0:q(2v+w)+py:qw+p(v+2w)), \quad \frac{q(2v+w)+py}{v} = \frac{qw+p(v+2w)}{w}, \quad \frac{p}{q} = \frac{w}{v}.$$

$$\frac{A_1A''}{A''A_2} = -\frac{w}{v}, \quad A_1(0:2v+w;w), \quad A_2(0:v:v+2w) \implies A''(0:-v(2v+w)+wv:-vw+w(v+2w))$$
$$A''(0,-v^2:w^2).$$

Análogamente, se obtienen:

$$B''(-u^2:0:w^2), C''(-u^2:v^2:0).$$

Se concluye que los tres puntos A'', B'', C'' están alineados, pues el determinante formado por sus coordenadas es igual a cero. La ecuación de la recta que los contiene es

$$v^2w^2x + u^2w^2y + u^2v^2z = 0$$
, o bien $\frac{x}{u^2} + \frac{y}{v^2} + \frac{z}{w^2} = 0$.


El tripolo ⁴ de esta recta es el punto

$$P^2(u^2:v^2:w^2).$$

Como se comprueba determinando A^*, B^* y C^* y comprobando que las rectas AA^*, BB^*, CC^* concurren en P^2 :

 $A^{\prime\prime}$ y A^* dividen armónicamente a B y C si

$$\frac{BA''}{A''C} = -\frac{BA^*}{A^*C} = \frac{p}{q}.$$



 $^{^4}$ Si r es una recta que corta a los lados BC, AC y AB de un triángulo \widehat{ABC} en los puntos L, M y N, respectivamente, y si L', M' y N' son los conjugados armónicos de L respecto a B y C, de M respecto a A y C y de N respecto a A y B, respectivamente, entonces las rectas AL', BM' y CN' se cortan en un punto R, denominado tripolo de r.

$$\begin{split} \frac{BA''}{A''C} &= \frac{p}{q}, \quad B(0:1:0), \quad C(0:0:1), \quad A''(0:-v^2:w^2) \Longrightarrow (0:-v^2:w^2) \equiv (0:q:p), \quad \frac{p}{q} = -\frac{w^2}{v^2}. \\ & -\frac{BA^*}{A^*C} = -\frac{w^2}{u^2} \quad \implies \quad A^*(0:v^2:w^2). \end{split}$$

Análogamente:

$$B^*(u^2:0:w^2), \qquad C^*(u^2:v^2:0).$$


Las rectas

$$AA^*: w^2y - v^2z = 0, \quad BB^*: w^2x - u^2z = 0, \quad CC^*: v^2x - u^2y = 0,$$

concurren en $P^2(u^2:v^2:w^2)$.

Notas:

• Otra manera de construir el cuadrado baricéntrico es la siguiente (ver Paul Yiu.- Introduction to Geometry of the Triangle (pag. 98)):



Construir el paralelogramo $AB_aA'C_a$ con B_a en AC y C_a en AB.

Construir el punto $BB_a \cap CC_a$ y unir éste con A para determinar X en BC.

Repetir la misma construcción, usando los pies B' y C' de las cevianas por P, para obtener Y en AC y Z en AB.

Entonces AX, BY, CZ concurren en el cuadrado baricéntrico P^2 de P.

Applet CabriJava: http://www.gt.matfun.ull.es/angel/cabri/baric2c.htm

Justificación analítica de esta construcción:

Como el punto del infinito de la recta AB es (-1:1:0), la recta por A'(0:v:w) y paralela a AB tiene por ecuación wx - vz = 0: ésta corta a AC (y = 0) en $B_a(v:0:w)$.

Como el punto del infinito de la recta AC es (1:0:-1), la recta por A'(0:v:w) y paralela a AB tiene por ecuación vx - wz = 0; ésta corta a AB (z = 0) en $C_a(w:v:0)$.

Las rectas $BB_a: wx - vz = 0$ y $CC_a: -vx + wy = 0$, se cortan en $(vw: -v^2: w^2)$.


El punto $X(0:-v^2:w^2)$ es la intersección de las rectas $AX:w^2y+v^2z=0$ y BC:x=0.

Análogamente, se obtienen $Y(-u^2:0:w^2)$ y $Z(-u^2:v^2:0)$.

Las rectas $AX: w^2y + v^2z = 0$, $AY: w^2x + u^2z = 0$ y $CZ: v^2x + u^2y = 0$, concurren en $P^2(u^2: v^2: w^2)$.

 \bullet En el caso de que P sea un punto impropio, para obtener su cuadrado baricéntrico, se procede como en cualquiera de los métodos anteriores, no obstante se tiene esta otra interpretación geométrica:

El punto impropio de una parábola circunscrita a un triángulo \widehat{ABC} , tiene cuadrado baricéntrico el perspector de la parábola; es decir, el centro de perspectividad del triángulo \widehat{ABC} y del formado por las tangentes a la parábola en los vértices de \widehat{ABC} .



Una cónica circunscrita a un triángulo tiene como ecuación baricéntrica

$$pyz + qzx + rxy = 0.$$

Si es tangente al al recta del infinito en el punto P(u:v:w), será una parábola, cuya ecuación se determina teniendo en cuenta que el punto está en la cónica, que el punto está en la recta del infinito y que la polar de P respecto a la cónica es la recta del infinito. Lo que equivale a plantear el siguiente

sistema de ecuaciones:

$$pvw + qwu + ruv = 0, \quad u + v + w = 0, \quad \begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La solucion (p:q:r) es el perspector de la parábola circunscrita a \widehat{ABC} :

$$\left(\frac{v+w}{vw}: \frac{v}{w(v+w)}: \frac{w}{v(v+w)}\right) \equiv ((v+w)^2: v^2: w^2) \equiv (u^2: v^2: w^2).$$

Para establecer que (p:q:r) es el perpector de la parábola, basta obtener las tangentes en los vértices de \widehat{ABC} a la cónica

$$pzy + qzx + rxy = 0,$$

que son

$$ry + qz = 0$$
, $rx + pz = 0$, $qx + py = 0$.

Las cuales determinan el triángulo $\widehat{A'B'C'}$, con vértices en

$$(-p:q:r), \qquad (p:-q:r), \qquad (p:q:-r).$$

Éste es perspectivo con \widehat{ABC} , con centro de perspectividad en P(p:q:r).

El lugar geométrico de los cuadrados baricéntricos de la recta del infinito x + y + z = 0, se obtiene eliminando u, v y w, entre las ecuaciones:

$$u + v + w = 0,$$
 $x = u^2, y = v^2, z = w^2.$

Y resulta:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2yz - 2zx - 2xy = 0,$$

que es la elipse de Steiner inscrita en \widehat{ABC} , tangente a los lados en sus puntos medios.

$$\stackrel{\triangle}{
abla}$$

* Raiz baricéntrica

Dado un punto P(u:v:w), en el interior de un triángulo \widehat{ABC} , tratamos determinar geométricamente el punto $\sqrt{P}(\sqrt{u}:\sqrt{v}:\sqrt{w})$.

Seguiremos los pasos inversos de la construción de $P^2(u^2:v^2:w^2)$ ya hecha.

Sean A'', B'' y C'' los puntos de intersección de tripolar de P con los lados BC, AC y AB, respectivamente. A^* es el punto armónicamente separado de A'' respecto a los puntos medios A_1 y A_2 de los segmentos A^*B y A^*C ; análogamente B^* y C^* . Entonces las rectas AA^*, BB^*, CC^* concurren en el punto \sqrt{P} .

Construcción gráfica de A^* :


Sea A''' el simétrico de C respecto a A'', \bar{A} uno de los puntos de corte de la circunferencia de diámetro BA''' con la perpendicular por A'' a BC. A^* es la intersección (comprendida entre B y C) de la circunferencia de centro en A'' y radio $\bar{A}A''$ con BC.

Esta construcción no depende del punto de corte \bar{A} tomado, ni de que se intercambien B y C.

La construcción, en la recta BC, del punto A^* se justifica tomando las coordenadas B(0), C(a), A''(x''), $A^*(x^*)$ y entonces $A_1(x^*/2)$ y $A_2((a-x^*)/2)$.

$$(A^* A'' A_1 A_2) = -1,$$
 $\frac{x^*/2 - x^*}{x^*/2 - x''} = -\frac{(x^* - a)/2 - x^*}{(x^* - a)/2 - x''},$ $x^* = x'' \pm \sqrt{x''(x'' - a)}.$

Para construir el punto $A^*(x^*)$, basta tener presente que en el triángulo rectángulo $\widehat{A'''} \overline{A}B$, la altura $h = \overline{A}A''$ es media proporcional entre los dos segmentos en que divide a la hipotenusa, $\overline{B}\overline{A''} = x''$ y $\overline{A''A'''} = x'' - a$.



Vamos ahora a obtener las coordenadas del punto \sqrt{P} , así construido:

Las intersecciones de la tripolar de P(u:v:w),

$$\frac{x}{u} + \frac{y}{v} + \frac{z}{w} = 0,$$

con los lados del triángulo son A''(0:-v:w) con BC, B''(-u:0:w) con AC y C''(-u:v:0) con AB. Como A'' es el punto medio de C y A''',

$$\frac{CA''}{A''A'''} = \frac{1}{1}, \quad A'''(0;\eta:\zeta), \quad C(0:0:\eta+\zeta) \quad \Longrightarrow \quad A''(0:-v:w) \equiv (0:\eta:\zeta+\eta+\zeta).$$

Luego, A'''(0:-2v:v+w).

Como también A_1 es el punto medio de $A^*(0:s:t)$ y B(0:s+t:0) y A_2 es el punto medios de A^* y C(0:0:s+t), se obtiene, de forma similar, que

$$A_1(0:2s+t:t), \qquad A_2(0:s:s+2t).$$

Al estar A^* armónicamente separado de A'', respecto a A_1 y A_2 , resulta

$$(A^* \ A'' \ A_1 \ A_2) = -1, \qquad \frac{A_1 A^*}{A^* A_2} = -\frac{A_1 A''}{A'' A_2} = \frac{p}{q}.$$

$$-\frac{A_1 A''}{A'' A_2} = \frac{p}{q}, \quad A''(0:-v:w) \equiv (0:q(2s+t)-ps:qt-p(s+2t)),$$

$$q(2s+t)-ps = -\lambda v \\ qt-p(s+2t) = \lambda w \end{cases} \} \quad \Longrightarrow \quad \frac{p}{q} = \frac{2sw+t(v+w)}{2tv+s(v+w)}.$$

$$\frac{A_1 A^*}{A^* A_2} = \frac{p}{q}, \quad A^*(0:s:t) \equiv (0:q(2s+t)+ps:qt+p(s+2t)),$$

$$(2tv+s(v+w))(2s+t)+(2sw+t(v+w))s = \lambda s \\ (2tv+s(v+w))t+(2sw+t(v+w))(s+2t) = \lambda t \end{cases}$$

Sistema que da como soluciones (0:s:t):

$$(0:0:0), \quad \left(0:\frac{\lambda}{-2\,v+2\,w}:\frac{\lambda}{2\,v-2\,w}\right),$$

$$\left(0:\frac{\lambda\,\sqrt{v}}{2\left(\sqrt{v}-\sqrt{w}\right)^3}:\frac{-\lambda\,\sqrt{w}}{2\left(\sqrt{v}-\sqrt{w}\right)^3}\right), \quad \left(0:\frac{\lambda\,\sqrt{v}}{2\left(\sqrt{v}+\sqrt{w}\right)^3}:\frac{\lambda\,\sqrt{w}}{2\left(\sqrt{v}+\sqrt{w}\right)^3}\right).$$

O, equivalentemente:


$$(0:0:0), (0:-1:1), (0:\sqrt{v}:-\sqrt{w}), (0:\sqrt{v}:\sqrt{w}).$$

Las primeras no determinan ningún punto, las segundas corresponden al punto del infinito de la recta BC y de las restantes la que está entre B y C es

$$A^*(0:\sqrt{v}:\sqrt{w})$$
. Análogamente $B^*(\sqrt{u}:0:\sqrt{w})$, $C^*(\sqrt{u}:\sqrt{v}:0)$.

Las rectas AA^*, BB^*, CC^* concurren en el $\sqrt{P}(\sqrt{u}: \sqrt{v}: \sqrt{w})$.

Nota: Otra manera de construir la raiz baricéntrica es la siguiente (ver Paul Yiu.- The uses of homogeneous barycentric coordinates in plane euclidean geometry (Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 31 (2000) pag. 574)):



Construir la circunferencia de diámetro BC.

Construir la perpendicular a BC en el pie A' de la ceviana AP, que interseca a la circunferencia en X (no importa la elección hecha). La bisectriz de \widehat{BXC} interseca a BC en X'.

De manera similar se obtienen los puntos Y' en AC y Z' en AB.

Las rectas AA', BB', CC' concurren en \sqrt{P} .

Justificación analítica de esta construcción:

De la semejanza de triángulos de ser \overline{BXC} un triángulo rectángulo (figura de la derecha), se sigue:

$$\frac{2h}{a} = \frac{A'X'}{X'M_a}, \qquad h^2 = BA' \cdot A'C.$$

$$P(u:v:w), \quad A'(0:u:v), \quad M_a(0:1:1), \qquad h^2 = \frac{aw}{v+w} \frac{av}{v+w}$$

$$\frac{A'X'}{X'M_a} = \frac{2\sqrt{vw}}{v+w}, \qquad A'(0:2v:2w), \qquad M_a(0:u+v:u+v).$$

$$X'(0:2v(v+w)+2\sqrt{vw}(v+w):2w(v+w)+2\sqrt{vw}(v+w)),$$

$$X'(0:v+\sqrt{vw}:w+\sqrt{vw})\equiv (0:(\sqrt{v}+\sqrt{w})\sqrt{v}:(\sqrt{v}+\sqrt{w})\sqrt{w})\equiv (0:\sqrt{v}:\sqrt{w}).$$

De forma análoga se obtine que $Y'(\sqrt{u}:0:\sqrt{v})$ y $Z'(\sqrt{u}:\sqrt{v}:0)$; así, AX',BY',CZ' son las cevianas del punto $\sqrt{P}(\sqrt{u}:\sqrt{v}:\sqrt{w})$.



Algunos cuadrados baricéntricos y raices baricéntricas

En el siguiente cuadro, X_n son puntos de la Enciclopedia de Centros de un Triángulo (ETC) ⁵ En la primera y última columna figuran las coordenadas baricéntricas que aparecen en la Enciclopedia o en su defecto la distancia al lado BC del triángulo de lados a = 6, b = 9 y c = 13.

Coordenadas	Raiz	Cuadrado	Coordenadas baricéntricas
baricéntricas			o distancia al lado BC
a:b:c	X_1	X_6	$a^2:b^2:c^2$
1:1:1	X_2	X_2	1:1:1
$\cos A : \cos B : \cos C$	X_3	X_{577}	$f(A, B, C) : f(B, C, A) : f(C, A, B),$ donde $f(A, B, C) =$ $\operatorname{sen} A - 8(\operatorname{area})^3 \cos A/(\operatorname{a}^2 b^2 c^2 \cos A \cos B \cos C)$
tag A : tag B : tag C	X_4	X_{393}	$\tan^2 A : \tan^2 B : \tan^2 C$
$a\cos(B-C):\cdots:\cdots$	X_5		0.0391628733 cm
$a^2:b^2:c^2$	X_6	X_{32}	$a^4:b^4:c^4$
$\frac{1}{b+c-a}:\cdots:\cdots$	X_7	X_{279}	$\frac{1}{(s-a)^2}: \frac{1}{(s-b)^2}: \frac{1}{(s-c)^2}$
$b+c-a:\cdots:\cdots$	X_8	X_{346}	$(b+c-a)^2:(c+a-b)^2:(a+b-c)^2$
$a(b+c-a):\cdots:\cdots$	X_9	X_{220}	$a^{2}(b+c-a)^{2}:b^{2}(c+a-b)^{2}:c^{2}(a+b-c)^{2}$
b+c:c+a:a+b	X_{10}	X_{594}	$(b+c)^2:(c+a)^2:(a+b)^2$
$(b+c-a)(b-c)^2:\cdots:\cdots$	X_{11}		1.6896160921 cm
$(b+c)^2/(b+c-a):\cdots:\cdots$	X_{12}		0.4852666929 cm

 $^{^5}$ Un centro de un triángulo es un punto definido como una función de las variables a,b y c, que son las longitudes de los lados de un triángulo, de la forma

donde fes homogénea en $a,b,c,\,{\bf y}$

$$|f(a, b, c)| = |f(a, c, b)|.$$

Enlaces a Centros de un Triángulo:

ETC: http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/index.html

Quim Castellsaguer.-TOT TRIANGLES WEB: http://www.xtec.es/ qcastell/ttw/ttwesp/portada.html Cabri macros for triangle centres: http://www.maths.gla.ac.uk/ wws/cabripages/triangle/macros.htm

Laboratorio virtual de triángulos con Cabri II (Ricardo Barroso Campos):

http://www.personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/index.htm

$a^2(b^2+c^2):\cdots:\cdots$	X_{39}		0.8545388615 cm
$\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$	X_{75}	X_{76}	$\frac{1}{a^2}:\frac{1}{b^2}:\frac{1}{c^2}$
$\frac{a}{b+c}$:	X_{81}	X_{593}	$ \frac{a^2 - b^2 - c^2}{(\frac{a}{b+c})^2 : (\frac{b}{c+a})^2 : (\frac{c}{a+b})^2 } $
$(a+b)(a+c):\cdots:\cdots$	X_{86}	X_{1509}	$(a+b)^2(a+c)^2:(b+c)^2(b+a)^2:(c+a)^2(c+b)^2$
$\operatorname{sen} \frac{A}{2} : \operatorname{sen} \frac{B}{2} : \operatorname{sen} \frac{C}{2}$	X_{174}	X_{57}	$\frac{a}{b+c-a}:\frac{b}{c+a-b}:\frac{c}{a+b-c}$
$\sqrt{a^3}:\sqrt{b^3}:\sqrt{c^3}$	X_{365}	X_{31}	$a^3:b^3:c^3$
$\sqrt{a}:\sqrt{b}:\sqrt{c}$	X_{366}	X_1	a:b:c
2.8231516102 cm		X_{10}	b+c:c+a:a+b
2.3521229242 cm		X_{37}	a(b+c):b(c+a):c(a+b)
2.5314608965 cm		X_{38}	$a(b^2+c^2):b(c^2+a^2):c(a^2+b^2)$
2.0539077723 cm		X_{39}	$a^{2}(b^{2}+c^{2}):b^{2}(c^{2}+a^{2}):c^{2}(a^{2}+b^{2})$
1.8857323317 cm		X_{42}	$a^{2}(b+c):b^{2}(c+a):c^{2}(a+b)$
1.5059252580 cm		X_{58}	$a^{2}(b+c)(a+c):b^{2}(c+a)(b+a):c^{2}(a+b)(b+c)$
1.9236819112 cm		X_{81}	a(c+b)(a+c):b(a+c)(b+a):c(b+a)(c+b)
1.7512928290 cm		X_{82}	$a(a^2+b^2)(a^2+c^2):b(b^2+c^2)(b^2+a^2):c(c^2+a^2)(c^2+b^2)$
2.2119833027 cm		X_{83}	$(a^2 + b^2)(a^2 + c^2) : (b^2 + c^2)(b^2 + a^2) : (c^2 + a^2)(c^2 + b^2)$
2.3997047930 cm		X_{86}	(a+b)(a+c):(b+c)(b+a):(c+a)(c+b)
3.0460198705 cm		X_{141}	$b^2 + c^2 : c^2 + a^2 : a^2 + b^2$
2.6095991023 cm		X_{115}	$(a^2 - b^2)^2 : (b^2 - c^2)^2 : (c^2 - a^2)^2$
1.9594901144 cm		X_{171}	$a^2 + abc : b^3 + abc : c^3 + abc$