

Sea una circunferencia Γ de centro O . Sobre ella se toman dos puntos fijos A y B que son los dos vértices de la base de un triángulo $\widehat{ABC}$ inscrito en Γ . Si un punto P recorre la circunferencia Γ , hallar el lugar geométrico

- 1) del ortocentro H_p del triángulo $\widehat{ABP}$.
- 2) del ortocentro H'_p del triángulo $\widehat{A'B'C'}$, siendo A', B' y C' las intersecciones de la circunferencia Γ con las bisectrices internas de los ángulos en A, B y P , respectivamente.


SOLUCIÓN:

Problema propuesto en el Laboratorio virtual de triángulos con Cabri (TriangulosCabri), con el número 409.

<http://www.personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/index.htm>

Propuesto por José María Pedret. Ingeniero Naval. (Esplugas de Llobregat, Barcelona).

Utilizaremos coordenadas baricéntricas homogéneas y los cálculos los haremos con MATHEMATICA, utilizando algunas rutinas incluidas en el cuaderno **Baricentricas.nb**, disponible en <http://garcia capitán.auna.com/baricentricas>.



- 1) Tomemos como triángulo de referencia el dado $\widehat{ABC}$ y un punto $P(u, v, w)$ en su circunferencia circunscrita Γ :

$$a^2vw + b^2wu + c^2uv = 0.$$

El ortocentro del triángulo $\widehat{ABP}$ es

$$H_p \left(-(S_Bv - S_Cw)(S_Au + S_B(u + w)), -(S_Au - S_Cw)(S_Bv + S_A(v + w)), (S_Au + S_B(u + w))(S_Bv + S_A(v + w)) \right).$$

El cual se obtiene intersectando las perpendiculares desde los vértices A, B y P a los lados opuestos, que tienen como ecuaciones respectivas:

$$(S_Au + S_B(u + w))y + (S_Au - S_Cw)z = 0,$$

$$(S_Bv + S_A(v + w))x + (S_Bv - S_Cw)z = 0,$$

$$(-S_Bv - S_A(v + w))x + (S_Au + S_B(u + w))y + (S_Au - S_Bv)z = 0,$$

donde

$$S_A = \frac{-a^2 + b^2 + c^2}{2}, \quad S_B = \frac{a^2 - b^2 + c^2}{2}, \quad S_C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}.$$

Por ejemplo, la primera es la recta que pasa por $A(1, 0, 0)$ y por el punto del infinito $(S_Bu - S_Cw, S_Cw - S_Au, S_Au + S_B(u + w))$ de la perpendicular a $wx - uz = 0$ (ecuación de BP).

Eliminando u, v, w se obtiene la ecuación implícita del lugar geométrico descrito por H_p :

$$a^2(S_Ax - S_Cz)(S_By + S_A(y + z)) + (S_By - S_Cz)(b^2(S_Ax + S_B(x + z)) + c^2(S_Cz - S_Ax)) = 0.$$

O bien,

$$\boxed{a^2yz + b^2zx + c^2xy - 2S_cz(x + y + z) = 0.}$$

Que es la circunferencia simétrica de Γ , respecto a AB , como se comprueba sustituyendo en la ecuación de la circunferencia circunscrita Γ , $a^2yz + b^2zx + c^2xy = 0$, las expresiones de la simetría respecto a AB :

$$x' = c^2x + 2S_Bz, \quad y' = c^2y + 2S_Az, \quad z' = -c^2z.$$

2) Para la segunda parte utilizamos el hecho⁽¹⁾ de que las alturas del triángulo $\widehat{A'B'C'}$ son las bisectrices interiores del triángulo $\widehat{ABP}$.

Determinamos las bisectrices de $\widehat{ABP}$ utilizando una de las rutinas, **CuartaRecta**, que define Francisco García Capitán en "Giros con baricéntricas", disponible en

<http://www.aloj.us.es/rbarroso/trianguloscabri/sol/sol309garcap/sol309garcap.pdf>,

para obtener una recta que forma con otra un ángulo dado, siendo éste el formado por otras dos rectas dadas. La sintaxis es **CuartaRecta**[P,r1,r2,r3], que determina la recta **r4** que pasa por el punto P y que forma con la recta **r3** el mismo ángulo que **r1** forma con **r2**. (Ver también LA GACETA 10 (2007) 2 p. 488).

En nuestro caso la cuarta recta es, por ejemplo, la bisectriz AP que es una recta del haz $AC + \mu AB$ y que forma igual ángulo con las rectas AB y AP .

`Solve[CuartaRecta[{1,0,0},{0,0,1},{0,1,0}+\[Mu]{0,0,1},
{0,1,0}+\[Mu]{0,0,1}]==\[Lambda]{0,w,u},{\[Mu],\[Lambda]}]`

donde $\{1,0,0\}$, $\{0,0,1\}$, $\{0,1,0\}$, $\{0,w,u\}$ son el punto A y las rectas AB , AC y AP , respectivamente.

Esto permite obtener el valor de μ , que determina la recta del haz de punto base A , que es la bisectriz AP y cuya ecuación es

$$cwy + \left(-cv + \sqrt{c^2v^2 + b^2w^2 + (-a^2 + b^2 + c^2)vw}\right)z = 0.$$

Análogamente, obtenemos que la ecuación de la bisectriz PB es


$$c\left(-cu + \sqrt{c^2u^2 + a^2w^2 + (a^2 - b^2 + c^2)uw}\right)x + ((-a^2 + b^2 - c^2)u - a^2w)z = 0.$$

El punto de intersección de estas bisectrices es

$$H'_p\left(w\left((-a^2 + b^2 - c^2)u - a^2w\right),\right. \\ \left.-\left(\sqrt{c^2u^2 + a^2w^2 + (a^2 - b^2 + c^2)uw} - cu\right)\left(cv - \sqrt{c^2v^2 + b^2w^2 + (-a^2 + b^2 + c^2)vw}\right),\right. \\ \left.cw\left(cu - \sqrt{c^2u^2 + a^2w^2 + (a^2 - b^2 + c^2)uw}\right)\right).$$

⁽¹⁾ El punto medio del incentro $I(a,b,c)$ y el exincentro $I_a(-a,b,c)$, situados en la bisectriz interior del vértice A de un triángulo $\widehat{ABC}$, está en su circunferencia circunscrita.

En efecto, dicho punto medio tiene de coordenadas $(-a^2, b(b+c), c(b+c))$, que satisfacen a la ecuación $a^2yz + b^2zx + c^2xy = 0$ de la circunferencia circunscrita.



En consecuencia, el triángulo $\widehat{A'B'C'}$, con vértices en los puntos de corte de las bisectrices interiores de $\widehat{ABC}$ con su circunferencia circunscrita, es el homotético de $\widehat{I_aI_bI_c}$, con vértices en los exincentros de $\widehat{ABC}$, mediante la homotecia de centro en I y razón $1/2$. Luego, sus correspondientes lados son paralelos y, por tanto, la bisectriz AI en A , que es perpendicular a I_bI_c , también lo es a $B'C'$. Por consiguiente, las bisectrices interiores de $\widehat{ABC}$ son las alturas de $\widehat{A'B'C'}$.

Eliminando las u, v y w se obtiene la ecuación implícita del lugar geométrico que describe H'_p :

$$(c^2xy - abxz + b^2xz + a^2yz - abyz - abz^2)(c^2xy + abxz + b^2xz + a^2yz + abyz + abz^2) = 0.$$

O bien,

$$a^2yz + b^2zx + c^2xy - abz(x + y + z) = 0.$$

$$a^2yz + b^2zx + c^2xy + abz(x + y + z) = 0.$$

Se trata de dos circunferencia que contienen a los vértices A y B y cuyos centros están en los puntos de intersección de la mediatriz del segmento AB con la circunferencia Γ :

$$(a(a+b), b(a+b), -c^2), \quad (a(-a+b), (a-b)b, c^2).$$

En realidad, el lugar geométrico de H'_p sólo es la parte de estas circunferencias contenidas en Γ .