

Hallar el ángulo $\widehat{ACB}$ (su valor numérico) sabiendo que $\widehat{ABC}$ es un triángulo isósceles con $AC = BC$ y que los segmentos AB, AD, DE, EF, FC son iguales, con D y F sobre BC , con el orden $CFDB$, y E sobre CA , con E interior.

SOLUCIÓN:


Problema propuesto en el Laboratorio virtual de triángulos con Cabri (TriangulosCabri), con el número **611**

<http://www.personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/index.htm>

Con el siguiente enunciado:

1.- Hallar el ángulo ACB (su valor numérico) sabiendo que (ABC) isósceles con $AC = BC$ y que los segmentos AB, AD, DE, EF, FC son iguales. con $D, y F$ sobre BC , con el orden $CFDB$, y E sobre CA , con E interior.

Dalcín. M (2009): Un estudio sobre la iniciación al pensamiento deductivo en la formación de profesores de matemática. El caso de la geometría. Seminario de Investigación en Matemática Educativa III Programa de Doctorado, CICATA - IPN, México Montevideo, tutorizado por : Dr. Javier Lezama. (p. 153)



Tomemos un segmento AB , de longitud c , y sobre su mediatriz debemos encontrar los puntos C , de tal forma que el triángulo $\widehat{ABC}$ cumpla con las condiciones requeridas en el enunciado, salvo que NO impondremos inicialmente que el punto E esté en el segmento AC .

Sea C' en la mediatriz de AB y $\theta = \widehat{ABC'} = \widehat{BAC'}$ el ángulo en la base del triángulo isósceles $\widehat{ABC'}$. El punto D debe ser el simétrico de B respecto a la perpendicular desde A a BC' y $\widehat{ADB} = \theta$ (el triángulo $\widehat{BDA}$ es isósceles). Luego, $\widehat{BAD} = \pi - 2\theta$ y $\widehat{DAC'} = \pm(\pi - 3\theta)$.

Sea E el punto simétrico de A respecto a la perpendicular desde D a AC' ; finalmente, sea F el simétrico de D respecto a la perpendicular desde E a BC' ($AD = DE = EF = AB = c$); con lo que $\rho = BF = 2a \cos \theta + 2a \cos 5\theta$.

Consideremos el punto X en la recta BC' que dista c de F , El lugar de X cuando θ varía (es decir, cuando C' varía en la mediatriz de AB) es la curva, dada en coordenadas polares con polo en B y semieje polar BA :

$$\rho = c(\pm 1 + \cos \theta + \cos 5\theta).$$

Los vértices C de $\widehat{ABC}$ son los puntos de intersección de esta curva con la mediatriz a AB :

$$\rho = \frac{c}{2 \cos \theta}.$$

Resolviendo estas ecuaciones (tomando en la primera el signo "+", que es la misma cuando tomamos el "-" y $\theta \rightarrow \theta + \pi$), ayudándonos de un programa de cálculo simbólico, obtenemos para el ángulo en el vértice C , los seis valores:

$$20^\circ, \quad 36^\circ, \quad 60^\circ, \quad 100^\circ, \quad 108^\circ, \quad 140^\circ$$

Que corresponde, respectivamente, a las soluciones $(\widehat{ABC})$ de las ecuaciones anteriores:

$$80^\circ, \quad 72^\circ, \quad 60^\circ, \quad 40^\circ, \quad 36^\circ, \quad 20^\circ.$$

De estos valores, el único triángulo isósceles $\widehat{ABC}$, para el cual el punto E esté en el segmento AC , es el que tiene ángulo en el vértice C igual a 20° .

Cuando $\widehat{ACB} = 36^\circ, 108^\circ$ el punto E coincide con C ; cuando $\widehat{ACB} = 60^\circ, D = C$.

