
## Problema 793.-

En un triángulo dado, inscribir un rectángulo que tenga por diagonal una longitud dada.

F. G.M. (1912):Exercices de Géometrie comprenant l'exposé des Méthodes Géométriques et 2000 Questions Résolues. Cinquième èdition. (Paris)

## Solución de Florentino Damián Aranda Ballesteros, profesor del IES Blas Infante de Córdoba.

Sea el triángulo dado ABC y  $d=M_1M_2=MB$ , la diagonal del rectángulo. Trazamos por los vértices C y B, la paralela




y la perpendicular al lado AB, respectivamente. Así, construimos el triángulo rectángulo ABC.

Sobre la hipotenusa de este triángulo, determinamos el punto M tal que d=MB.

Podemos inscribir en dicho triángulo así, el rectángulo  $BM_1MM_2$ .

El lado  $MM_1$  interceptará a los lados AC y BC en los puntos D y E, respectivamente.

Vamos a probar entonces la igualdad entre los segmentos  $MM_1 = DE$ . Tenemos que:



$$\frac{MM_1}{AB} = \frac{M_1C'}{BC'} (I).$$

$$\frac{DE}{AB} = \frac{M_1C'}{BC'} \ (II)$$

Entonces, de (I) y (II), concluimos que  $MM_1=DE$ . A partir de esta propiedad, la construcción resulta trivial, ya que el rectángulo  $DEE^{'}D^{'}$ , donde D' y E', son las proyecciones de los puntos D y E sobre el lado AB, sería una solución de nuestro problema.

El número máximo de soluciones sería 2 para cada lado del triángulo, donde reposa uno de los lados del rectángulo.

