**Problema 800.** Dado el triángulo  $\triangle ABC$  y un punto P, llamamos XYZ al triángulo ceviano de P respecto  $\triangle ABC$ . Hallar el lugar geométrico de los puntos P tales que el triángulo  $\triangle AYZ$  tiene la mitad de área que  $\triangle ABC$ .

Francisco Javier García Capitán (2016), comunicación personal.

Solución de Ercole Suppa. Usamos coordenadas baricéntricas. Puesto P(x, y, z), tenemos que

$$X = (0:y:z), \quad Y = (x:0:z), \quad Z = (x:y:0)$$

Usando la fórmula del área en coordenadas baricéntricas, tenemos

$$\frac{(XYZ)}{(ABC)} = \pm \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{(x+z)(x+y)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 0 & z \\ x & y & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2}$$
$$\Leftrightarrow \quad \frac{yz}{(x+z)(x+y)} \pm \frac{1}{2}$$

que conducen a dos ecuaciones

$$C_1: x^2 + xy + xz + 3yz = 0$$
  
 $C_2: x^2 + xy + xz - yz = 0$ 

Entonces el lugar geométrico de los puntos P(x:y:z) que cumplen la condicion requerida es la unión de dos cónicas  $C_1$  y  $C_2$  que ahora vamos a estudiar.


La conica  $C_1$  pasa por los puntos B(0:1:0), C(0:0:1) y tiene dos puntos en el infinito  $I_1(1:-1:0)$  y  $I_2(1:0:-1)$  ya que

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + xy + xz + 3yz = 0 \\ x + y + z = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^2 + x(y+z) + 3yz = 0 \\ y + z = -x \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} yz = 0 \\ x + y + z = 0 \end{array} \right.$$

Por lo tanto  $C_1$  es una hipérbola con centro en G(1:1:1) como

$$\left(1\,1\,1\right) \cdot \begin{pmatrix} 1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}\,0\,\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2}\,\frac{3}{2}\,0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Los asíntotas  $GI_1$  y  $GI_2$  tienen ecuaciones x + y - 2z = 0 y x - 2y + z = 0 y son paralelas a las lineas AB y AC respectivamente.



La conica  $C_2$  pasa por los puntos B(0:1:0), C(0:0:1) y tiene dos puntos en el infinito  $I_1(1:-1:0)$  y  $I_2(1:0:-1)$  ya que

$$\begin{cases} x^2 + xy + xz - yz = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + x(y+z) - yz = 0 \\ y + z = -x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} yz = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Por lo tanto  $C_2$  es una hipérbola con centro en el punto E(-3:1:1) de tal manera que  $EA=3\cdot AG$ , como

$$\left(111\right) \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Los asíntotas  $EI_1$  y  $EI_2$  tienen ecuaciones x + y + 2z = 0 y x + 2y + z = 0 y son paralelas a las lineas AB y AC respectivamente.

