Problema 800 de triánguloscabri. Dado el triángulo ABC y un punto P, llamamos XYZ al triángulo ceviano de P respecto ABC. Hallar el lugar geométrico de los puntos P tales que el triángulo AYZ tiene la mitad de área que ABC.

Propuesto por Francisco Javier García Capitán.

Solución de Francisco Javier García Capitán.

Usando coordenadas baricéntricas, si P=(u:v:w) tendremos Y=(x:0:z) y Z=(x:y:z). Entonces, usando la fórmula del cociente $(AYZ)/(ABC)=\pm\frac{1}{2}$, tendremos

$$\frac{1}{(x+z)(x+y)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 0 & z \\ x & y & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{-yz}{(x+z)(x+y)} = \pm \frac{1}{2},$$

que nos lleva a alguna de las ecuaciones

$$(1) x^2 + xy + xz + 3yz = 0,$$

(2)
$$x^2 + xy + xz - yz = 0.$$

La cónica (1) pasa por B y C, y sus puntos infinitos son los puntos $J_b = (-1:0:1)$ y $J_c = (-1:1:0)$, es decir los puntos del infinito de las rectas CA y AB. Escrita en forma matricial $PMP^t = 0$, obtenemos la matriz M y su adjunta:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{Adj}(M) = \begin{pmatrix} -9 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -5 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix},$$

de manera que el centro de la cónica, polar de la recta del infinito x + y + z = 0 es el baricentro G del triángulo ABC.

Para obtener algún punto más de la hipérbola, observamos que ésta pasa por los puntos $(\pm\sqrt{3}:-1:1)$. cuyo punto medio es A y están en sobre las recta y+z=0, paralela a BC por A.

Si trazamos una paralela por $V=(\sqrt{3}:-1:1)$ a la mediana AG, su intersección con la recta BC nos da el punto $N=(0:2-\sqrt{3}:-2-\sqrt{3})$.

Usamos el siguiente lema:

Lema. Si X = (0:v:w) es un punto de la recta BC y M es el punto medio de BC, la distancia (con signo) entre M y X viene dada por la fórmula

$$MX = \frac{(w-v)a}{2(v+w)}.$$

Demostración. Para cada punto O sobre la recta BC se tendrá la relación

$$OX = \frac{v}{v+w}OB + \frac{w}{v+w}OC.$$


Tomando como origen O el punto m tendremos las abscisas

$$x = \frac{v}{v+w} \left(-\frac{a}{2}\right) + \frac{w}{v+w} \left(\frac{a}{2}\right) = \frac{(w-v)a}{(v+w)2}.$$

Aplicando este lema obtenemos que

$$AV = MN = \frac{-4}{-2\sqrt{3}} \cdot \frac{a}{2} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

Entonces, dado el triángulo ABC, tenemos la siguiente construcción:




- 1. Hallamos el punto medio M del lado BC y el baricentro G.
- 2. Construimoos un triángulo equilátero EBC y su baricentro G'.
- 3. Trazamos la paralela por A a BC y sus puntos de intersección V, W con una circunferencia de centro A y radio GE.
- 4. Ahora podemos calcular la hipérbola que pasa por los puntos B, C, V, W y cualquiera de sus simétricos respecto del baricentro, que es el centro de la cónica.

La cónica (2) también tiene a J_b y J_c como puntos del infinito. Obtenemos su forma matricial $PMP^t = 0$ y la matriz adjunta de M.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{Adj}(M) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

A partir de aquí vemos que su centro es el punto Q=(-3:1:1). Este punto está sobre la mediana AG y cumple QA:AM=2:1, siendo M el punto medio de BC.

El punto Q por tanto queda muy lejos del triángulo ABC. Para encontrar puntos más próximos a la figura del triángulo, consideramos el punto simétrico U de A respecto de M y el punto medio V de MU.



La paralela por U a BC corta a la cónica en puntos S, S' de la forma $(1:1\pm\sqrt{2}:1\mp\sqrt{2})$. Estos puntos con punto medio U están a distancia $\sqrt{2}a$ del punto U, longitud fácilmente de obtener.

La paralela por V a BC corta a la cónica en puntos T,T' de la forma $(1:1\pm\sqrt{2}:1\mp\sqrt{2})$. Estos puntos con punto medio V están a distancia $\frac{\sqrt{17}a}{2}$ del punto V. Para obtener esta longitud, levantamos una perpendicular $CE = \frac{BC}{4}$ y entonces $BE = \frac{\sqrt{17}a}{2}$.

