**Problema 807.**- Dada una circunferencia de radio R y diámetro EF, consideremos A, O, B, puntos de EF tal que  $EA = AO = OB = BF = \frac{1}{2}R$ .

Sea ADC un triángulo genérico de lados a,d,c, con D y C sobre la circunferencia dada y tal que DC contenga a B. Demostrar que  $a^2 + d^2 + c^2$  es constante y calcular su valor.


Generalización del director a partir del Problema 1 Capítulo 4 de Berrondo- Agrell, M. (2006): 100 enigmas de geometría.

## Capítulo 4.

## Una bisabuela muy geómetra.

A mi bisabuela le ha gustado siempre la geometría. Así que ayer dibujó un círculo de 4 cm de radio, con un diámetro EF dividido en cuatro partes iguales por los puntos A, O (centro del círculo) y B. Luego dibujó una cuerda CD que pasaba por B y formaba un ángulo de 43º con el diámetro EF. Entonces me comentó que su edad era igual a la suma de los cuadrados en cm² de las longitudes de los lados del triángulo ACD, es decir...

Tu turno:



 $\theta = \angle DBA$ .

Sea M el punto medio de DC.

Solución de Saturnino Campo Ruiz, Profesor de Matemáticas jubilado, de Salamanca.

De suponer que es cierto el enunciado, si se toma D que coincida con F se obtienen  $a^2=4R^2$ ;  $d^2=\frac{R^2}{4}\;y\;c^2=\frac{9}{4}R^2$  que sumado todo da el valor  $\frac{13}{2}R^2$ , que **SOLO DEPENDE DE** R.

Denotamos por m y n los segmentos DB y BC respectivamente: m+n=a.

Para calcular la suma de los cuadrados de los lados vamos a aplicar el teorema del coseno a los triángulos ADB y ABC que comparten el lado AB.

Para ello necesitamos conocer el valor del coseno del ángulo

De los triángulos ODM y OMB resulta que  $OM^2=R^2-\frac{a^2}{4}$ ,  $MB^2=\frac{R^2}{4}-OM^2=\frac{a^2-3R^2}{4}$  por tanto  $cos^2\theta=\frac{a^2-3R^2}{R^2}$ .

La potencia de B respecto de la circunferencia (DEC) en valor absoluto es

$$m \cdot n = BC \cdot BD = BE \cdot BF = R^2 - \frac{R^2}{4} = \frac{3}{4}R^2$$
.

Como m+n=a, los segmentos verifican la ecuación  $x^2-ax+\frac{3}{4}R^2=0$  de discriminante  $\Delta=\sqrt{a^2-3R^2}=m-n$ , entonces  $\cos\theta=\frac{m-n}{R}$  o bien  $R\cdot\cos\theta=m-n$ .

Ya estamos en condición de aplicar el teorema del coseno. Se tiene

$$\begin{aligned} d^2 + c^2 &= 2R^2 + m^2 + n^2 - 2R\cos\theta \cdot (m - n) = 2R^2 + m^2 + n^2 - 2(m - n)^2 \\ &= 2R^2 - m^2 - n^2 + 4mn = 2R^2 - a^2 + 6mn = 2R^2 - a^2 + \frac{9}{2}R^2 \end{aligned}$$

Transponiendo  $a^2$  resulta finalmente  $a^2+d^2+c^2=\frac{13}{2}R^2$ , que era el valor esperado.

La edad de la bisabuela se obtiene para R = 4 y es  $13 \cdot 8 = 104$  años.