
Problema n° 817

Construir el triángulo cuyos datos son  $h_a, v_a$ , b - c. ( $v_a$  es la bisectriz interna del ángulo A)

Santamaría, J. (2017): Comunicación personal.

## Solution proposée par Philippe Fondanaiche



AD et AH sont respectivement la bissectrice et la hauteur issues de A dans le triangle ABC. On pose AB =c, AC = b avec AC > AB. D'où  $r = AH/(AC - AB) = h_a/(b-c)$  qui est donné par hypothèse.

On désigne par  $\alpha = \angle BAD = \angle CAD$  et  $\alpha_0 = \angle HAD$ . Comme  $h_a$  et  $v_a$  sont donnés, on déduit l'angle  $\alpha_0$  tel que  $\cos(\alpha_0) = h_a / v_a$ 

On a les relations :

 $AB = c = h_a/\cos(\alpha - \alpha_0)$  et  $AC = b = h_a/\cos(\alpha + \alpha_0)$ 

D'où  $(b-c)/h_a = 1/r = 1/\cos(\alpha + \alpha_0) - 1/\cos(\alpha - \alpha_0)$  qui aboutit à l'équation du second degré dont l'inconnue est  $x = \sin(\alpha)$ :

 $x^2 + 2r.\sin(\alpha_0).x - \cos^2(\alpha_0) = 0 \text{ qui a pour discriminant } \Delta = r^2.\sin^2(\alpha_0) + \cos^2(\alpha_0).$ 

On obtient la solution unique  $x = \sin(\alpha) = -r.\sin(\alpha_0) + \sqrt{\Delta}$  et  $\alpha = Arcsin(-r.\sin(\alpha_0) + \sqrt{\Delta})$  La construction du triangle ABC peut donc être faite à la règle et au compas:

On trace le point H quelconque sur l'axe des abscisses, puis AH perpendiculaire à cet axe. D'où le point D tel que AD est rayon du cercle de centre A et de rayon  $v_a > h_a$ . Comme la variable  $\cos(\alpha)$  est solution d'une équation du second degré, on sait la construire à la règle et au compas. D'où l'angle  $\alpha$  permettant de tracer les demi-droites AB et AC qui font l'angle  $\alpha$  avec AD.