
Problema 818

Una recta paralela al lado AC de un triángulo equilátero ABC interseca a AB en M y a BC en P, construyendo el triángulo equiátero BMP.

Sea D el centro de BMP(incentro, ortocentro,...) y E el punto medio de AP. Determina los ángulos del triángulo CDE.

Honsberger, R. (1997): In Pólya's Footsteps (Dolciani Mathematical Expositions Number 19)(MAA)(p. 125)

Solución del director:



Si tomamos como centro de coordenadas B(0,0), y sin pérdida de generalidad tomamos C(1,0), es $A(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$

Así, si P es (m,0), tenemos:

$$M\left(\frac{m}{2}, \frac{\sqrt{3}m}{2}\right), D\left(\frac{m}{2}, \frac{\sqrt{3}m}{6}\right), E\left(\frac{1}{4} + \frac{m}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

Así, el vector
$$\overrightarrow{DE} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}m}{6}\right)$$
, el vector $\overrightarrow{EC} = \left(\frac{3}{4} - \frac{m}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, y el $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{m}{2} - 1, \frac{\sqrt{3}m}{6}\right)$

Observemos el producto escalar de los vectores \overrightarrow{DE} y \overrightarrow{EC} :

$$\overrightarrow{DE} \ \overrightarrow{EC} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}m}{6}\right) \left(\frac{3}{4} - \frac{m}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{3}{16} - \frac{m}{8} - \frac{3}{16} + \frac{3m}{24} = 0$$

Luego el triángulo DEC es rectángulo en E.

Por otra parte si observamos los módulos de los vectores \overrightarrow{DE} y \overrightarrow{DC} , son:

$$\overrightarrow{DE} = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{36} + \frac{3}{36} - \frac{6}{24}}, \overrightarrow{DC} = \sqrt{\frac{m^2}{4} + 1 - m + \frac{3m^2}{36}}$$

Es decir, $\overrightarrow{DE}=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{m^2}{12}-\frac{m}{4}}$, $\overrightarrow{DC}=\sqrt{1+\frac{m^2}{3}-m}$. Al ser la hipotenusa doble de un cateto los ángulos pedidos son 30º 60º 90º.

Ricardo Barroso Campos.

Jubilado.

Sevilla.

España.