Problema 821


Construir el triángulo cuyos datos son ha, ma, b+c.

Santamaría, J. (2017): Comunicación personal.

Resuelto por JULIÁN SANTAMARÍA TOBAR profesor de Dibujo del IES La Serna de Fuenlabrada


El problema se va a resolver por dos métodos, por homotecia y por una cuaterna.

## Primer método, resolución por homotecia



La distancia formada por los puntos de tangencia de los círculos exinscritos de centros Oc y Ob con el lado a, mide el segmento (b+c), y es conocida su posición puesto que su centro es el pie M de la mediana. El centro de homotecia negativo de estas dos circunferencias es el vértice A, y como el punto de tangencia Tc es conocido, se puede hallar su homotético (Tc) en la otra exinscrita, con lo cual, se puede obtener su centro Ob.

## Resolución del ejercicio




Se fija el triángulo rectángulo AHM y el segmento Tc Tb que mide (b+c), y su punto medio es M. Se obtiene el punto (Tc) que es homotético del punto Tc, ya que está alineado con el centro de homotecia negativo A, y además, el segmento Tb(Tc) es el diámetro perpendicular al lado a, con lo cual, su punto medio es el centro Ob, y aplicando la misma homotecia, al punto Ob, se obtiene el centro Oc.

Por último los vértices C y B se hallan mediante un arco capaz de 90° del segmento formado por


los centros hallados de las circunferencias exinscritas, porque las dos bisectrices que parten de cada uno de estos vértices, son perpendiculares, y pasan por estos centros.

## Segundo método, resolución por una cuaterna armónica



En un triángulo, el vértice A y el pie V' de su bisectriz exterior están separados armónicamente de los centros Oc-Ob de las circunferencias exinscritas de los ángulos B y C. Al proyectar esta cuaterna armónica V'-A-Oc-Ob en el lado a, resulta la cuaterna V'-H-Tc-Tb. De estos cuatro puntos se conocen tres Tc, Tb y H, por lo tanto se puede obtener el punto V'.

## Resolución del ejercicio



Como en la resolución anterior se fija el triángulo AHM, y los puntos Tc y Tb. Se halla el punto V' que es el conjugado armónico del punto H respecto del segmento Tc Tb.

Al obtener la bisectriz exterior del ángulo A, se fijan los centros Oc y Ob de las circunferencias exinscritas.

Por último, como en la resolución del primer método, los vértices B y C se hallan mediante un arco capaz de 90°.